PROTOCOLO FLACIDEZ FACIAL E CORPORAL

Trissilinol 0,5%-2ml

Ácido Alfa Lipóico 0,5%-2ml

Ácido Hialurônico 1,2mg-2ml

Condroitin Sulfato 200mg-2ml

Lidocaína 40mg-2ml

Aplicar Intradérmico
Agulha 4mm
1x por semana

Trissilinol: regula atividade dos fibroblastos aumentando síntese de colágeno, elastina e proteoglicanas, além de se incorporar na estrutura da molécula de colágeno reorganizando-a melhor.

Ácido Alfa Lipóico: possui ação antioxidante e também age como cofator de algumas enzimas relacionadas com a eliminação do colágeno danificado melhorando a flexibilidade da pele.

Ácido Hialurônico: atua retendo água no tecido conjuntivo e envolve as fibras de colágeno e elastina resultando em maior sustentação da pele.

Condroitin Sulfato: é um mucopolissacarídeo com ação antiinflamatória que inibe a enzima elastase leucócito evitando alterações dos componentes fundamentais do tecido conjuntivo (proteoglicanos e fibras colágenas) e também contribui para a síntese da matriz extracelular.

Lidocaína: excelente anestésico local diminuindo a sensibilidade à dor no momento da aplicação.