

PROTOCOLO FLACIDEZ (PASSO 1 E 2)

Tratamento para Flacidez Facial

Protocolo:

- EGF 1% + IGF 1% + TGFb3 1%.....2ml
- Trissilinol 10mg/2ml.....2ml
- Ácido Alfa Lipóico 0,5%.....2ml

Aspirar o conteúdo das 3 ampolas em uma seringa de 10ml resultando num volume total de 6ml para ser aplicado intradérmico com agulha de 4mm pela técnica de nápagge ponto a ponto na área a ser tratada pela técnica .

- DMAE 7%.....2ml
- Lidocaína 2%.....2ml

Aplicar com uma agulha de 13mm, 0,2ml por ponto nos músculos faciais em que se deseja obter a contração para um efeito lifting.

Fatores de crescimento: São proteínas que se ligam aos receptores da superfície celular, ativando a proliferação e/ou diferenciação celular. Muitos Fatores de Crescimento são versáteis, estimulando a divisão celular em diferentes tipos de células, enquanto outros são específicos para um tipo celular particular. A ligação aos receptores presentes na superfície da célula alvo emite um sinal que atravessa a membrana citoplasmática e efetua um comando celular ou nuclear. Esses processos, muitas vezes são básicos no funcionamento da células, tais como: angiogênese, mitogênese, transcrição genética, entre outros.

Trissilinol: regula atividade dos fibroblastos aumentando síntese de colágeno, elastina e proteoglicanas, além de se incorporar na estrutura da molécula de colágeno reorganizando-o melhor.

Ácido alfa lipóico: possui ação antioxidante e também age como cofator de algumas enzimas relacionadas com a eliminação do colágeno danificado melhorando a flexibilidade da pele.

DMAE: atua nas fibras musculares promovendo contração que reflete numa ação firmadora e tensora da pele (Efeito Lifting).

Lidocaína: excelente anestésico local diminuindo a sensibilidade à dor no momento da aplicação.

PROTOCOLO FLACIDEZ (PASSO 1 E 2)

Tratamento para Flacidez Corporal

Em casos de flacidez corporal pode-se aplicar o mesmo protocolo adicionando Benzopirona e Rutina assim trata-se também a celulite junto com a flacidez da pele.

Esse produto é muito indicado para tratamento de celulite por seu mecanismo de ação:

Benzopirona e Rutina: atuam em sinergismo melhorando a circulação periférica. A rutina diminui a permeabilidade capilar e possui ação eutrófica o que confere mais resistências às paredes dos capilares devido à produção de colágeno e a benzopirona ativa atividade dos macrófagos e diminui edema e inflamação local.

Protocolo:

- EGF 1% + IGF 1% + TGFb3 1%.....2ml
- Trissilinol 10mg/2ml.....2ml
- Ácido Alfa Lipóico 0,5%.....2ml
- Benzopirona 0,5% + Rutina 2,5%.....2ml

Aspirar o conteúdo das 4 ampolas em uma seringa de 10ml resultando num volume total de 8ml para ser aplicado intradérmico com agulha de 4mm pela técnica de nápagge ponto a ponto na área a ser tratada pela técnica .

- DMAE 7%.....2ml
- Lidocaína 2%.....2ml

Aplicar com uma agulha de 13mm, 0,2ml por ponto nos músculos corporais em que se deseja obter a contração para um efeito lifting.