


PROTOCOLO SKINBOOSTER

Ácido Hialurônico 1,5%
Trissilinol 10mg
D-Pantenol 40mg
Biotina 10mg
Lidocaína 10mg
Veículo qsp 2ml (seringa)


Aplicar ID com agulha de 13mm

Skinbooster restaura intensamente o equilíbrio hídrico da pele. A proposta é melhorar a elasticidade e estrutura dérmica da pele, trazendo novamente um aspecto mais jovem, fresco e natural. É um rejuvenescimento gradual de dentro para fora conferindo mais vitalidade à pele.


O ácido hialurônico quando injetado tem uma característica bioquímica fundamental: higroscopia. Ele “atrai” moléculas de água do meio externo e hidrata intensamente a pele, a ponto de suavizar linhas de expressão de maneira acentuada. Os outros princípios ativos da fórmula vão complementar esse tratamento ajudando também na produção de colágeno.



Pele desidratada



Skinbooster age devolvendo a hidratação da pele



Pele hidratada e saudável

Se o resultado esperado é suavizar as marcas de expressão ou de acne, atenuar linhas e sulcos, suavizar rugas ou melhorar o contorno facial, pescoço, colo ou lábios; a técnica do Skinbooster pode ser a opção mais eficaz.

RECOMENDAÇÃO: Antes de fazer a aplicação, faz-se necessário o teste de sensibilidade cutânea ao produto. Orienta-se fazer uma pápula na parte interna do braço, e aguardar de 60 a 90 minutos.

PROTOCOLO SKINBOOSTER

APLICAÇÃO DO SKINBOOSTER

Não há necessidade de utilizar anestésico tópico uma vez que a formulação já possui lidocaína. Pode ser aplicado de duas maneiras: micropuncturas (com uma agulha muito fina- agulha 30G de 13mm) ou com uso de microcânula (esta consegue atingir áreas maiores, com um único ponto de entrada na pele).

DURAÇÃO DO TRATAMENTO: São indicadas de 2 a 3 sessões, com intervalo de um mês entre cada um delas e sessões de manutenção semestral ou anual. Os primeiros resultados são visíveis em 30 a 45 dias. Pode ser associada ao skinbooster lasers, luz pulsada, radiofrequência, toxina botulínica ou peelings. As associações de técnicas sempre potencializam os resultados.

PÓS-PROCEDIMENTO: Vermelhidão, edema, dores, comichão, sensibilidade no local, que desaparecem de 3 a 7 dias. Alguns pacientes mais sensíveis, os efeitos podem durar até 15 dias.

ÁREAS TRATADAS: rosto, pescoço, colo e mãos.

