





MODO DE APLICAÇÃO PARA MICROAGULHAMENTO

- Calibre sua caneta de microagulhamento de 0,5mm 1mm;
- Abra as ampolas e coloque 1 ampola de Matrixyl e 1 ampola de Pept-Solution em um seringa estéril;
- Vá gotejando e realizando o microagulhamento levemente, e não deixe sangrar;
- Faça um leve selamento com vaselina sólida por 4 horas;
- Remova a vaselina com água boricada e aplique o protetor mineral:
- 24 horas depois já pode começar o home care Pept-Solution.

NÚMERO DE SESSÕES INDICADAS: DE 2 A 4 SESSÕES A CADA 3 MESES

INTERVALO 21 DIAS



MODO DE APLICAÇÃO PARA SUBCUTÂNEO

- Misture a solução com 1 ml de anestésico com ou sem vaso (individual);
- Injete com cânula 22G na região da flacidez;
- Geralmente você irá injetar 2,5ml por hemiface;
- Podendo em casos de flacidez grave injetar 5ml por lado da face (serão 2 caixas de Pept-Solution.

INTERVALO 30 DIAS





APLICAR 1X AO DIA

- Pode ser usado durante o dia ou a noite:
- Em caso de pele irritada, suspender o uso e entrar em contato com o proifisisonal;
- Esse home care potencializa o resultado do procedimento com a solução Pept-Soution.

PROJOCOII coffege









@VALERIADALCOLL





VALERIADALCOLL.COM.BR

